

Vaccin contre l'hépatite A

La vaccination a sauvé plus de vies que n'importe quelle autre intervention médicale. Les vaccins aident notre système immunitaire à reconnaître et à combattre les bactéries et les virus qui causent les maladies graves.

L'hépatite A est une maladie évitable par la vaccination.

- **L'hépatite A (HA)** est un virus qui attaque le foie. Sur 1000 personnes atteintes par le virus, 1 à 3 peuvent en mourir. Chez les adultes de 50 ans et plus, 1 personne sur 4 atteinte de HA est hospitalisée et 18 cas sur 1000 peuvent être mortels.
- Il n'existe aucun traitement connu permettant de guérir d'une infection par le virus de l'hépatite A, qui est une maladie résolutive.
- L'hépatite A se transmet par voie oro-fécale.
 - En avalant des boissons ou de la nourriture contaminée (p. ex. : nourriture préparée par une personne atteinte de ce virus);
 - Par contact direct avec une personne atteinte du virus;
 - Contamination par l'environnement ou par des objets (p. ex. sur les comptoirs et sur la vaisselle). Le virus peut survivre et demeurer infectieux pendant plusieurs semaines dans l'environnement.
- Les risques de contagion sont très élevés pour les personnes qui utilisent les mêmes toilettes que la personne atteinte par ce virus ou qui partagent des boissons ou de la nourriture avec elle.
- L'hépatite A peut également se transmettre par contact sexuel ou l'utilisation commune d'articles tels que les pailles ou les pipes servant à la consommation de drogues.

Quels sont les symptômes de l'hépatite A?

- Les symptômes de la maladie apparaissent entre 15 et 50 jours après avoir contracté le virus.
- Les symptômes durent généralement 1 ou 2 semaines, mais ils peuvent également durer des mois. Ils se manifestent par :
 - De la fatigue, de la fièvre, une perte d'appétit et des nausées.
 - La jaunisse (coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux).
 - Des urines foncées et des selles de couleur claire.
- Bien que certaines personnes atteintes d'hépatite A ne développent aucun symptôme, elles demeurent tout de même contagieuses.
- Les personnes infectées deviennent contagieuses environ 2 semaines avant l'apparition des symptômes et 1 semaine après celle de la jaunisse.

Comment prévenir l'hépatite A?

- Faites-vous vacciner. Quand vous ou votre enfant recevez le vaccin, vous contribuez aussi à la protection des autres.
- Adoptez de bonnes pratiques sanitaires (p. ex. se laver les mains).

Qui peut se faire vacciner gratuitement?

- Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus dont les cas de contagion ont été relevés dans les 14 jours suivant l'exposition à l'hépatite A.
- Les enfants de 1 à 15 ans qui vivent dans les régions de santé du Nord ou dans des réserves de la Saskatchewan (sauf Creighton, Air Ronge et La Ronge).
- Les candidats ou receveurs d'une greffe du foie.
- Les receveurs d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH).
- Les personnes qui souffrent de troubles de saignement, et celles qui reçoivent des transfusions sanguines répétées, des produits du sang ou des facteurs de la coagulation dérivés du plasma.
- Les personnes non immunisées qui ont une maladie chronique du foie (y compris l'alcoolisme, l'hépatite C, l'hépatite B ou la cirrhose) et qui ne sont pas immunisées contre l'hépatite A.
- Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.
- Les personnes qui utilisent ou partagent de l'équipement pour renifler, fumer ou injecter des drogues illicites.
- Les personnes dont les partenaires sexuels ou les membres de la famille utilisent des drogues illicites.

Qui ne devrait pas être vacciné?

- Toute personne souffrant d'une maladie grave aiguë, accompagnée ou non de fièvre, doit reporter la vaccination.
- Toute personne ayant eu des réactions sérieuses ou constituant un danger de mort à la suite de l'injection antérieure d'une dose de vaccin contenant l'hépatite A, ou à un des composants du vaccin.

Quelles sont les réactions les plus courantes au vaccin?

- **Les vaccins sont des produits sûrs. En fait, il est bien plus dangereux de contracter l'hépatite A que de se faire vacciner.**
- Une douleur, une rougeur et une enflure temporaires au point d'injection.
- Des maux de tête, de la fatigue, de la fièvre et des maux d'estomac peuvent aussi apparaître après la vaccination.
- Ces réactions sont légères et durent généralement 1 ou 2 jours.
- Ne traiter la fièvre (qu'après 6 à 8 heures suivant la vaccination) si vous ou votre enfant ne vous sentez pas bien, s'il refuse de boire ou s'il a du mal à dormir.

Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après une vaccination à cause de la possibilité extrêmement rare d'une réaction allergique constituant un danger de mort nommée anaphylaxie. Ce genre de réaction peut comprendre de l'urticaire, des problèmes respiratoires ou une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. **Si cela se produit après avoir quitté la clinique, faites immédiatement appel à de l'aide médicale ou composez le 911.**

À qui devez-vous signaler toute réaction au vaccin?

- Signalez dès que possible toute réaction inattendue ou indésirable en composant le 811 ou en communiquant avec votre infirmière de la santé publique locale, votre infirmière praticienne ou votre médecin.

Communiquez avec une infirmière de la santé publique si :

- vous avez des questions ou des craintes concernant votre réaction ou la réaction de votre enfant à un vaccin.
- vous ou votre enfant avez dû aller chez le médecin, à l'hôpital ou dans un centre de soins de santé pour un symptôme pouvant être lié à la vaccination.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre bureau de la santé publique local, votre médecin, votre infirmière praticienne, InfoSanté en ligne ou composez le 811.

Consentement des mineurs matures

Il est recommandé que les parents/tuteurs discutent du consentement à la vaccination avec leurs enfants.

Le consentement s'adresse en premier lieu aux parents ou aux tuteurs. Toutefois, en Saskatchewan, les adolescents de 13 à 17 ans capables de comprendre les avantages et les réactions possibles à chaque vaccin, ainsi que les risques de ne pas être vaccinés, peuvent légalement consentir ou refuser la vaccination en présentant un consentement éclairé, en tant que mineur mature, au fournisseur de soins de santé.

Que contient le vaccin?

AVAXIM^{MD} contient les ingrédients suivants : virus inactivé de l'hépatite A (souche GBM), 2-phénoxyéthanol, éthanol anhydre, formaldéhyde, hydroxyde d'aluminium (exprimé en tant qu'aluminium), milieu 199 de Hanks dans de l'eau pour injection, ainsi qu'une quantité infime de néomycine. Le vaccin ne contient ni thimérosal ni latex.

HAVRIX^{MD} 1440 et **HAVRIX^{MD} 720** contient les ingrédients suivants : virus de l'hépatite A inactivé par le formaldéhyde, hydroxyde d'aluminium, acides aminés injectables, phosphate disodique, phosphate monopotassique, polysorbate 20, chlorure de potassium, chlorure de sodium et eau pour injection. Résidus provenant du processus de fabrication : sulfate de néomycine. Le vaccin ne contient ni thimérosal ni latex.

VAQTA^{MD} contient les ingrédients suivants : protéine virale de l'hépatite A inactivée, sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium amorphe, borate de sodium, chlorure de sodium, eau pour injection, quantité infime de néomycine, albumine de sérum bovin et formaldéhyde. Il ne contient pas de thimérosal. Le bouchon du flacon contient, toutefois, du latex.

Les feuillets d'information sur les vaccinations offertes par la province se trouvent à l'adresse suivante : www.saskatchewan.ca/bonjour/.

Références : [Guide canadien d'immunisation](#). Monographie des produits (AVAXIM^{MD} 2021; HAVRIX^{MD} 2021; VAQTA^{MD} 2023).

Utilisez de l'acétaminophène (Tylenol[®], Tempra[®]) ou de l'ibuprofène (Advil[®], Motrin[®]) pour traiter la fièvre et la douleur chez les enfants et les adultes. Ne donnez jamais d'AAS (Aspirine[®]) aux enfants de moins de 18 ans en raison du risque sérieux de syndrome de Reye.