

Vaccin antipneumococcique conjugué 21

La vaccination a sauvé plus de vies que n'importe quelle autre intervention médicale. Les vaccins aident notre système immunitaire à reconnaître et à combattre les bactéries et les virus qui causent des maladies graves.

Certaines maladies pneumococciques sont évitables par la vaccination.

- Les maladies pneumococciques sont causées par différents types de bactéries *Streptococcus pneumoniae* (streptocoques) et causent de nombreux décès dans le monde.
- Les maladies pneumococciques sont les plus fréquentes chez les jeunes enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes présentant certains problèmes de santé sous-jacents ou menant certains styles de vie.
- Ces bactéries peuvent causer des otites, des sinusites ou des bronchites ainsi que des infections graves, voire mortelles, telles qu'une infection des poumons (pneumonie), du sang (bactériémie) et des membranes qui entourent le cerveau (méningite), ou causer la mort.
- Ces infections peuvent également provoquer des dommages permanents au cerveau ou la surdité.

Comment les bactéries pneumococciques sont-elles propagées?

- Les bactéries pneumococciques sont transmises directement d'une personne à l'autre par la toux, les éternuements, la salive lors de baisers, en partageant un verre et par les contacts rapprochés (face à face).
- On peut attraper ces bactéries en touchant des surfaces sur lesquelles elles se trouvent.
- Beaucoup de personnes sont porteuses de la bactérie pneumococcique dans le nez et la gorge, sans pour autant être malades.

Comment prévenir la pneumococcie?

- Faites-vous vacciner. Quand vous ou votre enfant recevez le vaccin, vous contribuez aussi à la protection des autres.
- Lavez-vous les mains régulièrement.
- Couvrez-vous la bouche quand vous toussiez, et le nez et la bouche quand vous éternuez pour empêcher un contact direct avec les gouttelettes projetées par le nez ou la gorge.

Important à savoir :

- Ce vaccin offre une protection contre 21 souches pneumococciques qui affectent communément les adultes âgés de 65 ans et plus.

- Ce vaccin ne protège pas contre les autres souches de bactérie pneumococciques.

Qui peut recevoir ce vaccin gratuitement?

- Les adultes âgés de 65 ans et plus qui n'ont jamais reçu de dose de vaccin antipneumococcique.
- Les adultes âgés de 65 ans et plus présentant des facteurs de risque de maladie pneumococcique comme ceux qui sont :
 - résidents d'établissements de soins de longue durée, de foyer de soins personnels ou de foyers de groupes;
 - atteints d'un déficit en complément acquis;
 - atteints d'asplénie (congénitale, acquise ou fonctionnelle);
 - atteints d'un cancer (doivent avoir un diagnostic récent ou ne pas être en rémission);
 - atteints d'une immunodéficience congénitale;
 - qui sont greffons de cellules souches hématopoïétiques;
 - atteints du virus de l'immunodéficience humaine (VIH);
 - qui sont immunosupprimés en lien avec une maladie ou un traitement;
 - receveurs ou candidats de greffe de cellules des îlots pancréatiques;
 - atteints d'une néphropathie;
 - atteints de drépanocytose et d'autres hémoglobinopathies;
 - receveurs ou candidats d'une greffe d'organe plein.

REMARQUE : L'admissibilité en fonction de ces facteurs de risque est basée sur l'âge, le facteur de risque, leur dossier de vaccination antipneumococcique et l'intervalle depuis la dernière dose de vaccin antipneumococcique.

Qui ne devrait pas recevoir ce vaccin?

Les personnes souffrant d'une maladie grave aiguë, accompagnée ou non de fièvre, doivent reporter la vaccination. Les personnes ayant déjà eu une réaction grave ou constituant un danger de mort à la suite de l'injection d'une dose d'un vaccin antipneumococcique ou à tout composant du vaccin.

Quelles sont les réactions courantes à ce vaccin?

Les vaccins sont des produits très sûrs et efficaces. En fait, il est bien plus dangereux d'avoir une pneumococcie que de se faire vacciner.

- Douleurs, rougeurs et enflure au point d'injection.
- Fatigue, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires.
- Ces réactions légères durent généralement un jour ou deux.
- Ne traiter la fièvre qu'après 6 à 8 heures suivant la vaccination si vous ne vous sentez pas bien et avez du mal à dormir.

Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après la vaccination en raison de la possibilité extrêmement rare d'une réaction allergique, constituant un danger de mort, nommée anaphylaxie. Ce genre de réaction peut comprendre de l'urticaire, des problèmes respiratoires ou une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres.

Une telle réaction peut être traitée et se produit dans moins d'un cas sur un million de vaccinations. Si cela se produit après avoir quitté la clinique, faites immédiatement appel à de l'aide médicale ou composez le 911.

À qui devez-vous signaler toute réaction au vaccin?

- Signalez dès que possible toute réaction inattendue ou indésirable en appelant la ligne Info-Santé 811 ou en communiquant avec un membre du personnel infirmier de la santé publique local, un membre du personnel infirmier praticien ou votre médecin.

Communiquez avec un membre du personnel infirmier de la santé publique si :

- vous avez des questions ou des craintes concernant votre réaction à un vaccin;
- vous avez dû aller chez le médecin, à l'hôpital ou dans un centre de soins de santé pour un symptôme pouvant être lié à la vaccination.

Quelle est la composition du vaccin?

CAPVAXIVE MD est composé de 21 sérotypes bactériens *Streptococcus pneumoniae* (3, 6A, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, deOAc15B, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F et 35B) conjugués à une protéine porteuse CRM197, de la L-histidine, du polysorbate 20, du chlorure de sodium et de l'eau pour l'injection. Sans agents de conservation. Sans latex.

Les feuillets d'information sur les vaccins offerts par la province se trouvent à l'adresse suivante : <https://www.saskatchewan.ca/bonjour/health-and-healthy-living/accessing-health-care-services/immunization-services>.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre bureau de la santé publique local, votre médecin, votre infirmière praticienne ou infirmier praticien, InfoSanté en ligne ou composez le 811.

Références : [Guide canadien d'immunisation](#).
Monographie de produit CAPVAXIVE^{MD}